

Notes floristiques
ou contribution additionnelle à la flore du Valais,

PAR

JOS. PANNATIER

Thalictrum fœtidum L. Très abondant dans les endroits rocheux et buissonneux sous Salins. Juin 1900.

Th. saxatile DC. Th. calcareum Jord. Th. Grenieri Lor. Crêtes calcaires entre la Maya et le mont Noble, 2400 m. Assez rare. 5 août 1901.

Th. Bauhini Crantz. Th. simplex et augustifolium auct. helv. Lieux humides, bords des chemins. Entre Loye et Merdasson de Grône. Peu commun. 9 août 1901.

Anemone baldensis L. Abondant dans toutes les sommités du mont Noble et de Larduzan, pas en dessous de 2100 m. Indifférent quant aux terrains.

Adonis vernalis L. Abondant sur les rochers calcaires de Pramilon sous Nax, 1280 m.

Ranunculus pyreneus L. var. *plantagineus* All. Très commun dans les pâturages de Gautier sur Nax et de Praloïn de Vernamiège, 1700 à 2000 m. Ordinairement moins précoce que le type. Juin 1900.

Ranunculus lanuginosus L. Bois et taillis de Vernamiège et Nax, 1400 m. Assez commun.

R. sceleratus L. Bords des fossés dans les prés près du village de Nax, 1307 m. Signalé dans le Cat. fl. Val. H. Jaccard seulement dans la plaine. Juin-juillet 1901.

Ficaria verna Huds. *Ranunculus Ficaria* L. Pas signalé? ou très rare dans le val d'Hérens; Erbioz-Bornué sous Vernamiège. Assez rare, alt. 1250 m.

Delphinium bonsolidia L. Très abondant dans les champs de Nax et Vernamiège. Juillet-novembre.

Aquilegia alpina L. Quelques pieds seulement au fond de Méribé (val d'Hérémence). Août 1901.

Aconitum paniculatum Lam. Pentes herbeuses de Larduzan avec l'*Aconitum Napellus*, 2250 m.

A. Lycoctonum L. Pentes herbeuses de Larduzan (sur Nax), 2200 m., Vernamiège, 1350 m.

Actea spicata L. Très commun sous les buissons à Vernamiège. Mai 1900.

Arabis auriculata Lam. Lieux pierreux, le long de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902.

A. caerulea All. Eboulis au pied du mont Noble, 2250 m. Eboulis des Becs de Bosson jusqu'à 3000 m. Juillet 1900.

A. muralis Bert. Pentes pierreuses et buissonneuses le long de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902.

A. alpestris Rchb. Très répandu dans les prés secs de Vernamiège sous les deux variétés. 1° vestita. 2° glabrata.

Cardamine resedifolia L. Lieux rocheux ou graveleux de Larduzan (sur Nax), 2400 m. et plus.

C. impatiens L. Pierriers humides le long du bisse d'Useigne, 1550 m. Assez rare.

Sisymbrium austriacum Jacq. Abondant sur les rochers le long de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902.

Clypeola Gaudini Trachsel. C. Jonthlaspi auct. non L. Cette jolie espèce tend à se répandre de plus en plus. Abondant de Sion à Sierre, Chippis, Sous Itravers, Vernamiège, assez commun dans les champs et les lieux graveleux jusqu'à 1400 m. où elle fleurit seulement en mai. Commun dans les endroits arides le long de la Borgne, de Longeborgne jusqu'à Useigne.

Biscutella laevigata L. var. *saxatilis* Schl. Abondant sur les rochers ensoleillés le long de la Borgne sous Vernamiège. Avril 1902.

Hutchinsia petraea R. Br. Assez répandu dans les endroits pierreux et graveleux le long de la Borgne, de Longeborgne à Useigne.

H. brevicaulis Hoppe. Lieux graveleux de Larduzan (sur Nax), 2500 m. et plus.

Viola Riviniana Rchb. Répandu partout dans les endroits buissonneux de Vernamiège, Mage, Erbioz, etc.

Polygala alpina Perr. et Song. Pelouses de Larduzan (sur Nax), Praloïn de Vernamiège, 1900-2675 m.

Silene alpina Thom. Glariers et éboulis au pied de la Maya de Loveigno, 2500 m.

Alsine mucronata L. Lieux pierreux et fissures des rochers de Larduzan (sur Nax), 2250 m. Très rare. Juillet 1900.

Arenaria biflora L. Pelouses humides, petites dépressions où la neige séjourne un peu plus longtemps. Larduzan (sur Nax). Pas de Lona, 2400 m.

Cerastium glutinosum Fr. *C. pumilum* Curt. ex Babgt. Lieux graveleux sous Vernamiège, 1200 m. Très rare.

C. alpinum L. var. *lanatum* Lam. Au col des Bréchets de Larduzan (sur Nax), 2500 m. Se distingue du type par des feuilles blanches laineuses.

Hypericum quadrangulum L. Pâturages subalpins dans les alpes de Grône (val de Reschy), 1500 m.

H. montanum L. Avec le précédent.

Geranium bohemicum L. Signalé jusqu'à présent seulement dans la chaîne bernoise, sauf une station entre Vercorin et Painsec, toujours sur l'emplacement d'anciens feux ou charbonnières. Trouvé le 27 juillet 1901, dans les pâturages des alpes de Grône sur Itravers (val de Reschy) à 1500 m., où selon toute probabilité il n'y eut jamais de charbonnières.

Impatiens Noli tangere L. Endroits humides, bords de la Borgne à Combiolaz sous Saint-Martin.

Oxytropis pilosa DC. Coteaux arides, pentes rocailleuses sous Pramilong de Nax.

O. lapponica Gaud. Pâturages de Larduzan à 2200 m. Assez abondant.

Astragalus exscapus L. Localisé dans la chaîne pennine de Vercorin à Binn. (Cat. fl. Val. H. Jaccard). Abondant sur les rochers calcaires de Pramilong sous Nax. Mai 1900. Abondant dans les forêts de pins, sous Vernamiège. Avril 1902.

Lathyrus vernus Bernh. *Orob. vernus* L. Rochers calcaires de Pramilon.

L. heterophyllus L. Buissons, bords des champs, abondant entre Nax et Vernamiège. Taillis sur Itravers, 1500 m.

Spiraea Aruncus L. Très rare, d'après H. Jaccard, au delà de Martigny. Abonde dans les taillis, dans les alpes de Grône (val de Reschy), 1650 m.

Sieversia reptans Sprgl. Eboulis des Bees de Bosson.

Potentilla rupestris L. Coteaux secs, pentes rocailleuses de Vernamiège. Assez commun jusqu'à 1550 m.

P. nivea L. Rocailles gazonnées. Alpes de Lens. Bellalui. Juillet 1900.

P. frigida Vill. Pelouses écorchées du mont Noble, au col des Brechets de Larduzan (sur Nax).

P. salisburgensis Hänk. var. *firma* Gaud. Au col des Brechets de Larduzan. Plante beaucoup plus robuste, tiges rougeâtres, plus raides que dans le type, ordinairement dressées, feuilles à pétiole plus court, folioles un peu plus larges, ordinairement plus denticulées, pubescence plus grande, fleurs plus petites. Assez rare.

Ribes petraeum Wulf. Taillis à Gautier, 1800 m.

Bupleurum rotundifolium L. Abondant dans les champs de Vernamiège jusqu'à 1400 m. Plus rare dans les cultures de Nax.

Orlaya grandiflora Hoffm. Champs de Vernamiège, 1320 m. Très rare.

Asperula odorata L. Pas signalé jusqu'à présent dans le val d'Hérens; quelques pieds en dessous de Vernamiège, à 1250 m. Abondant dans le vallon de Jarneyaz et les mayens de la Scie de Nax, jusqu'à 1600 m.

A. glauca Bess. *A. galioides* Bieb. Signalé dans la plaine du Rhône du Lac à Sierre. Coteaux secs de Vernamiège, 1350 m. Commune.

Rubia tinctorum L. Décombres à Vernamiège à 1320 m.

Scabiosa lucida Vill. Crêtes entre la Maya et le mont Noble, 2450 m.

Saussurea alpina DC. Petites plaques de gazon dans les éboulis des Bees de Bosson, 2700 m.

Mulgedium alpinum Cass. Taillis. Gautier sur Nax, 1650 m.

Pyrola uniflora L. Forêt sur Nax, 1600 m. Evolène.

P. minor L. Bois et pâturages de Gautier, 1850 m.

Monotropa Hypopitys L. Très abondant dans les forêts de Vernamiège.

Digitalis lutea L. Coteaux rocheux de Jarnayaz, Sous Erbioz (Vernamiège).

Myosotis stricta Link. Lieux sablonneux de Longeborgne à Useigne. Assez répandu. Avril 1902.

Gentiana utriculosa L. Prés tourbeux, sur Savièse. Juin 1900.

G. tenella Rottb. Lieux graveleux de Larduzan (sur Nax).

Menyanthes trifoliata L. Commun dans les petits étangs de Nax. Mai 1900.

Androsace helvetica Gaud. Rochers de Larduzan.

Teucrium Botrys L. Coteaux rocheux et sablonneux, bords des chemins. Vernamiège, 1320 m. Sous Erbioz.

Phelipæa arenaria Walp. Abonde dans les lieux secs de Vernamiège.

Vinca major L. Près du village de Chandolin de Savièse.

V. minor L. Pas signalé dans le val d'Hérens. Buissons sous Vernamiège. Hérémente. Avril 1902.

Amarantus retroflexus L. Décombres à Vernamiège, 1320 m.

Orchis sambucina L. Localisé aux environs de Martigny et du Simplon. Trouvé 2 ou 3 exemplaires à Praloïn sur Vernamiège, 1850 m.

Corallorrhiza innata R. Br. Forêt au-dessus de Nax, à 1600 m. Assez abondant sous les mélèzes.

Narcissus poeticus L. Dans les prairies de Nax, 1307 m. Probablement introduit ou échappé des jardins.

Colchicum alpinum DC. Dans les alpes de Grône. Assez abondant.

Tofieldia palustris Huds. T. borealis Whbg. Tourbières de Larduzan sur Nax.

Carex microglochin Whbg. Petite plaine tourbeuse en dessous du lac de Larduzan, 2250 m. Très abondant. Août 1901.

C. curvula All. Très abondant sur les rocailles de Larduzan et du mont Noble.

C. humilis Leyss. Très abondant sur les coteaux secs et rocheux de Longeborgne à Vernamiège, 1350 m.

C. ornithopoda Willd. Abondant à Vernamiège, 1400 m.

C. digitata L. Abondant dans les taillis à Vernamiège.

C. alba Scop. Abondant dans les taillis humides d'Erbioz.

Abies pectinata Dec. Pinus Picea L. Pinus Abies Duroi. Ça et là dans les forêts de Vernamiège.

Taxus baccata L. Rochers le long de la Borgne sous Vernamiège. Sur le calcaire.

Allosurus crispus Bernh. Eboulis granitiques au pied du mont Noble, 2250 m.
